

# Corrigé de l'épreuve mathématiques A XLSR - Filière MP-MPI 2024.

PAR SABIR ILYASS, ETTOUSY BADR.

**N.B** : Si vous trouvez des erreurs de français ou de mathématiques, ou bien si vous avez des questions et/ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter, en envoyant un mail à :  
**ilyassabir7@gmail.com** ou **badrettousy26@gmail.com**

15 avril 2024.

## Première partie

**1a.** Montrons que  $-M_0$  est diagonalisable.

Le polynôme caractéristique de  $-M_0$  est :

$$\begin{aligned}\chi_{-M_0}(X) &= \det(XI_n + M_0) \\ &= \begin{vmatrix} X & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & X & & & \\ 1 & 1 & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & & X & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & X \end{vmatrix}\end{aligned}$$

On a, alors

$$\chi_{-M_0}(1) = 0$$

Donc 1 est une valeur propre associée à  $-M_0$ , et le sous espace propre  $E_1$  de  $-M_0$  associé à la valeur propre 1 est :

$$E_1 = \ker(-M_0 - I_n) = \ker(M_0 + I_n)$$

Soit  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ , on a :

$$\begin{aligned}x \in E_1 &\Leftrightarrow (M_0 + I_n)x = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 + \dots + x_n = 0 \\ &\Leftrightarrow x \in H := \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \mid y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R} \text{ tel que } \sum_{k=1}^n y_k = 0 \right\}\end{aligned}$$

Et ça pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ , d'où

$$E_1 = H$$

Or  $H$  est un hyperplan, donc  $\dim E_1 = \dim H = n - 1$ .

Ainsi 1 est une valeur propre de  $-M_0$  d'ordre de multiplicité  $n - 1$ .

Or la somme des valeurs propres est la trace de  $-M_0$ , en particulier  $1 - n$  est une valeur propre de  $-M_0$ .

Et pour tout  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ , on a :

$$\begin{aligned} x \in E_{1-n} &\Leftrightarrow (-M_0 + (n-1)I_n)x = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket (n-1)x_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n x_k \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n \\ &\Leftrightarrow x \in \text{vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Ainsi

$$E_{1-n} = \text{vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Puisque  $\dim E_1 + \dim E_{1-n} = n$ , alors  $-M_0$  est diagonalisable, de valeurs propres 1 et  $1 - n$ .

**1b.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

On a par la définition du déterminant :

$$\det(xI_n + M_0) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (xI_n + M_0)_{\sigma(i), i}$$

Or pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$(xI_n + M_0)_{\sigma(i), i} = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma(i) \neq i \\ x & \text{si } \sigma(i) = i \end{cases}$$

Alors

$$\begin{aligned} \det(xI_n + M_0) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i \in \nu(\sigma)} x \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} \end{aligned}$$

D'autre part, d'après la question précédente

$$\det(xI_n + M_0) = (x-1)^{n-1}(x-(1-n))$$

D'où

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = (x-1)^{n-1}(x+n-1)$$

**2.** On a d'après la question précédente,

Pour  $x = 1$ , on a

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) = 0$$

D'autre part, en dérivant la fonction  $x \mapsto \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)}$ , on a

$$\sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \nu(\sigma) \geq 1}} \varepsilon(\sigma) \nu(\sigma) x^{\nu(\sigma)-1} = (n-1)(x-1)^{n-2}(x+n-1) + (x-1)^{n-1}$$

Au point  $x=1$ , on a :

$$\sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \nu(\sigma) \geq 1}} \varepsilon(\sigma) \nu(\sigma) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \geq 3 \\ 2 & \text{si } n = 2 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \nu(\sigma) &= \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \nu(\sigma) \geq 1}} \varepsilon(\sigma) \nu(\sigma) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \geq 3 \\ 2 & \text{si } n = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\int_0^x \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) t^{\nu(\sigma)} dt = \int_0^x (t-1)^{n-1}(t+n-1) dt$$

Or

$$\begin{aligned} \int_0^x \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) t^{\nu(\sigma)} dt &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \int_0^x t^{\nu(\sigma)} dt \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)} x^{\nu(\sigma)+1} \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \int_0^x (t-1)^{n-1}(t+n-1) dt &= \int_0^x (t-1)^n + n(t-1)^{n-1} dt \\ &= \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} + (x-1)^n + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

D'où

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)} x^{\nu(\sigma)+1} = \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} + (x-1)^n + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$$

Au point  $x=1$ , on a

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)} = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$$

3. On a

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) &= \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \varepsilon(\sigma)=1}} \varepsilon(\sigma) + \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \varepsilon(\sigma)=-1}} \varepsilon(\sigma) \\ &= \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \varepsilon(\sigma) = 1\} - \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \varepsilon(\sigma) = -1\} \end{aligned}$$

D'après la question précédente, on a  $\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) = 0$ .

Par suite

$$\text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \varepsilon(\sigma) = 1\} = \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \varepsilon(\sigma) = -1\}$$

D'où la probabilité qu'une permutation de  $\mathcal{S}_n$  tirée uniformément au hasard soit de signature prescrite est  $\frac{1}{2}$ .

4. Soit  $\sigma \in \mathcal{S}_n$ .

On a  $\sigma \in \mathcal{D}_n$  si et seulement si  $\nu(\sigma) = 0$

Et

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = \sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} \varepsilon(\sigma) + \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n \setminus \mathcal{D}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)}$$

Au point  $x=0$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} \Big|_{x=0} &= \sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} \varepsilon(\sigma) \\ &= \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma) = 1\} - \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma) = -1\} \end{aligned}$$

D'autre part

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} \Big|_{x=0} = (x-1)^{n-1} (x+n-1) \Big|_{x=0} = (-1)^{n-1} (n-1)$$

Ainsi

$$\text{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma) = 1\} - \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma) = -1\} = (-1)^{n-1} (n-1)$$

D'où le résultat.

5a. Soit  $m \in \mathbb{N}$ , On a  $(1, X, \dots, X^m)$  (resp.  $(1, (X-1), \dots, (X-1)^m)$ ) est une famille de polynômes non nuls échelonnée en degré, donc elle est libre avec le cardinal égal à  $m+1 = \dim(\mathbb{R}_m[X])$ .

Ainsi, elle est une base de  $\mathbb{R}_m[X]$ .

5b. Il suffit de montrer que  $M$  est la matrice de passage de la base  $(1, (X-1), \dots, (X-1)^m)$  à la base  $(1, X, \dots, X^m)$ .

On a pour tout  $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$

$$X^k = ((X-1) + 1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (X-1)^i$$

D'où le résultat.

5c. Puisque  $M$  est une matrice de passage, alors elle est inversible, et son inverse  $M^{-1}$  est la matrice de passage de la base  $(1, X, \dots, X^m)$  à la base  $(1, (X-1), \dots, (X-1)^m)$ .

On a pour tout  $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$

$$(X-1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^{k-i} X^i$$

Doù

$$M^{-1} = \left( \binom{k}{i} (-1)^{k-i} \right)_{(i,k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$$

5d. Soient  $(u_0, \dots, u_m), (v_0, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^{m+1}$ , tel que

$$\forall k \leq m, u_k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} v_l$$

Montrons que pour tout  $k \leq m$ , on a

$$v_k = \sum_{l=0}^k (-1)^{k-l} \binom{k}{l} u_l$$

On a

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \sum_{l=0}^m \binom{0}{l} v_l \\ \vdots \\ \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} v_l \end{pmatrix} \\ &= M \begin{pmatrix} v_0 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{pmatrix} v_0 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{l=0}^m (-1)^{0-l} \binom{0}{l} u_l \\ \vdots \\ \sum_{l=0}^m (-1)^{m-l} \binom{m}{l} u_l \end{pmatrix}$$

D'où le résultat.

6. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  
 Notons pour tout  $l \in \llbracket 0, k \rrbracket$   $\mathcal{F}_l$ : l'ensemble des permutations de  $\mathcal{S}_k$  ayant exactement  $l$  points fixes.  
 On a  $\{\mathcal{F}_0, \dots, \mathcal{F}_k\}$  forme une partition de  $\mathcal{S}_k$ , en particulier

$$\sum_{l=0}^k \text{Card}(\mathcal{F}_l) = k!$$

D'autre part

$$\text{Card}(\mathcal{F}_l) = \binom{k}{l} \text{Card}(\mathcal{D}_k) = \binom{k}{l} D_{l-k} = \binom{k}{l-k} D_{l-k}$$

Avec la convention  $D_0 = \text{Card}(\mathcal{D}_0) = 1$ .

D'où

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} D_k = k!$$

En utilisant la question précédente, on a

$$D_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k! = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

- 7a. Soit  $n \geq 2$ , on a

$$Y_n(\mathcal{D}_n) = \{-1, 1\}$$

Et pour  $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ , on a

$$\mathbb{P}(Y_n = \varepsilon) = \frac{\text{card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma) = \varepsilon\}}{D_n}$$

Or d'après la question 4, on a

$$\mathbb{P}(Y_n = 1) = \mathbb{P}(Y_n = -1) + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{D_n}$$

Donc

$$\mathbb{P}(Y_n = 1) = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n}$$

Et

$$\mathbb{P}(Y_n = -1) = \frac{1}{2} - \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n}$$

D'où

$$\mathbb{P}(Y_n = \varepsilon) = \frac{1}{2} + \varepsilon \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n}$$

**7b.** Soit  $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ , on a pour tout  $n \geq 2$

$$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}}$$

Or

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{e}$$

Donc

$$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2en!}$$

Avec

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2en!} = 0$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n} = 0$$

Ainsi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Y_n = \varepsilon)$  existe et on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Y_n = \varepsilon) = \frac{1}{2}$$

**8a.** On a

$$Z_n(\mathcal{S}_n) = \llbracket 0, n \rrbracket$$

Et pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z_n = k) &= \frac{\text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \nu(\sigma) = k\}}{n!} \\ &= \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} \\ &= \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{n-k} \frac{(-1)^l}{l!} \end{aligned}$$

**8b.** On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Z_n = k) = \frac{1}{ek!}$$

**8c.** Le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire est l'espérance de  $Z_n$ .

Et on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z_n] &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(Z_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{n-k} \frac{(-1)^l}{l!} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k-1)!} \sum_{l=0}^{n-k} \frac{(-1)^l}{l!}\end{aligned}$$

Or pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} k \mathbb{P}(Z_n = k) = \begin{cases} \frac{1}{e^{(k-1)!}} & \text{si } k > 0 \\ 0 & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

D'autre part, on a

$$\sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(Z_n = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}(Z_n = k) \mathbf{1}_{[n, +\infty[}(k)$$

La somme est fini à termes positifs, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}(Z_n = k) \mathbf{1}_{[n, +\infty[}(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} k \mathbb{P}(Z_n = k) \mathbf{1}_{[n, +\infty[}(k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{e^{(k-1)!}} = 1$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[Z_n] = 1$$

9. Pour  $n = 2, 3, 4$ , on a par calcul simple :

$$\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma) = 1$$

10. Soit  $n \geq 2$ , on a  $s(n, n)$  est le nombre de permutations  $\sigma$  de  $\mathcal{S}_n$  tel que  $\omega(\sigma) = n$ , donc  $l_{\omega(\sigma)} = 1$ .  
D'où  $\sigma = \text{id}_{\mathcal{S}_n}$ , par suite :

$$s(n, n) = 1$$

Et  $s(n, n)$  est le nombre de permutations  $\sigma$  de  $\mathcal{S}_n$  tel que  $\omega(\sigma) = 1$ , c'est à dire  $l_{\omega(\sigma)} = n$ .

Il existe  $(n-1)!$  permutations  $\sigma$  de  $\mathcal{S}_n$  tel que  $\omega(\sigma) = 1$  (cycle de longueur  $n$ )

D'où

$$s(n, 1) = (n-1)!$$

Pour tout  $k \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ , on a  $s(n, k)$  est le nombre de permutations  $\sigma$  de  $\mathcal{S}_n$  tel que  $\omega(\sigma) = k$   
Montrons que

$$s(n, k) = s(n-1, k-1) + (n-1)s(n-1, k)$$

Si  $\omega(\sigma) = k$  et sans déplacer  $n$ , donc  $n$  est fixe par  $\sigma$ , alors la restriction de  $\sigma$  à  $\mathcal{S}_{n-1}$  vérifie  $\omega(\sigma') = k-1$ , donc il y a  $s(n-1, k-1)$  permutations qui vérifie cette conditions.

Si  $\omega(\sigma) = k$  par déplacement de  $n$ , alors il y a  $(n-1)$  possibilités où on peut envoyer  $\sigma(n)$ , après avoir choisi la position de  $n$ , les  $n-1$  autres éléments forment sont isomorphe à une permutation  $\sigma'$  de  $\mathcal{S}_{n-1}$  tel que  $\omega(\sigma') = k$ .

Donc il y a  $(n-1)s(n-1, k)$  permutations qui vérifie cette conditions.

D'où

$$s(n, k) = s(n-1, k-1) + (n-1)s(n-1, k)$$

11. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , Posons pour tout  $j \in \mathbb{N}^*$

$$\kappa_j(x) = \sum_{k=1}^j s(j, k)x^k$$

On a pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \kappa_n(x) &= S(n, n)x^n + S(n, 1)x + \sum_{k=2}^{n-1} (s(n-1, k-1) + (n-1)s(n-1, k))x^k \\ &= x^n + (n-1)!x + \sum_{k=2}^{n-1} s(n-1, k-1)x^k + (n-1) \sum_{k=2}^{n-1} s(n-1, k)x^k \\ &= x^n + (n-1)!x + x \sum_{k=1}^{n-2} s(n-1, k)x^k + (n-1) \sum_{k=2}^{n-1} s(n-1, k)x^k \\ &= x^n + (n-1)!x + x(\kappa_{n-1}(x) - s(n-1, n-1)x^{n-1}) + (n-1)(\kappa_{n-1}(x) - s(n-1, 1)x) \\ &= (x+n-1)\kappa_{n-1}(x) \end{aligned}$$

Par télescopage, on a

$$\kappa_n(x) = \kappa_1(x) \prod_{i=2}^n (x+i-1) = x \prod_{i=1}^{n-1} (x+i) = \prod_{i=0}^{n-1} (x+i)$$

12. On a pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_n] &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X_n = k) \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k \text{Card}\{\sigma \in \mathcal{S}_n : \omega(\sigma) = k\} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k s(n, k) \end{aligned}$$

Or d'après la question précédente, pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k=1}^n k s(n, k)x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n-1} (x+i)$$

Donc pour  $x=1$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k s(n, k) &= \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n-1} (1+i) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n!}{k+1} \\ &= n! \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \end{aligned}$$

Par suite

$$\mathbb{E}[X_n] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Or

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right)$$



Alors

$$\mathbb{E}[X_n] \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

**13a.** On a d'après la question 11, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=2}^n k(k-1) s(n, k) x^{k-2} = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq k^i \neq k, j}}^{n-1} (x+i)$$

En particulier

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n k(k-1) s(n, k) &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq k^i \neq k, j}}^{n-1} (1+i) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{n!}{(k+1)(j+1)} \\ &= n! \sum_{k=0}^{n-1} \left( \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{(k+1)(j+1)} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \\ &= n! \left( \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right) \end{aligned}$$

D'où le résultat.

**13b.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n k^2 s(n, k) &= \sum_{k=2}^n k(k-1) s(n, k) + \sum_{k=1}^n k s(n, k) \\ &= \mathbb{E}[X_n] + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

**14a.** On a pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma)^2 &= \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k^2 s(n, k) \\ &= \mathbb{E}[X_n] + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} &= \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)^2 \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \left( \ln(n) + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right) \right)^2 \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n)^2 + \gamma^2 + O\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 2\gamma \ln(n) + 2O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) + 2\gamma O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

On a l'existence des suites  $(\varepsilon_{j,n})_{n \in \mathbb{N}}$  bornées pour tout  $j = 1, 2, 3$  tel que

$$\begin{cases} O\left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{\varepsilon_{1,n}}{n^2} \\ O\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\varepsilon_{2,n}}{n} \\ O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) = \frac{\ln(n)}{n} \varepsilon_{3,n} \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n)^2 + \gamma^2 + 2\gamma \ln(n) + \frac{\varepsilon_{1,n}}{n^2} + 2\frac{\varepsilon_{2,n}}{n} + 2\frac{\ln(n)}{n} \varepsilon_{3,n} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n)^2 + \gamma^2 + 2\gamma \ln(n) + \frac{\ln(n)}{n} \left( \frac{\varepsilon_{1,n}}{n \ln(n)} + 2\frac{\varepsilon_{2,n}}{\ln(n)} + 2\varepsilon_{3,n} \right) \end{aligned}$$

Avec  $\left( \frac{\varepsilon_{1,n}}{n \ln(n)} + 2\frac{\varepsilon_{2,n}}{\ln(n)} + 2\varepsilon_{3,n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite bornée. Alors

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{kj} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n)^2 + \gamma^2 + 2\gamma \ln(n) + O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

Or

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_n] &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi^2}{6} + o(1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi^2}{6} + O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma)^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} (2\gamma + 1)\ln(n) + \gamma^2 + \gamma - \frac{\pi^2}{6} + \ln(n)^2 + O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

D'où

$$c = \gamma^2 + \gamma - \frac{\pi^2}{6}$$

14b. On a

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} (\omega(\sigma) - \ln(n))^2 &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma)^2 - 2\frac{\ln(n)}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma) + \ln(n)^2 \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \omega(\sigma)^2 - 2\ln(n)\mathbb{E}[X_n] + \ln(n)^2 \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + c + O\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) \end{aligned}$$

15. On a d'après l'inégalité de Markov

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - \ln(n)| > \varepsilon \ln(n)) &\leq \frac{\mathbb{E}[(X_n - \ln(n))^2]}{\varepsilon^2 \ln(n)^2} \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2 \ln(n)^2} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} (\omega(\sigma) - \ln(n))^2 \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\varepsilon^2 \ln(n)} \left( 1 + \frac{c}{\ln(n)} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\varepsilon^2 \ln(n)} (1 + o(1)) \end{aligned}$$

Or, il existe un  $C > 0$  tel que

$$1 + o(1) \leq C$$

D'où

$$\mathbb{P}(|X_n - \ln(n)| > \varepsilon \ln(n)) \leq \frac{C}{\varepsilon^2 \ln(n)}$$

### Deuxième partie

16. Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n a_k b(k) &= \sum_{k=2}^n (A(k) - A(k-1))b(k) \\ &= \sum_{k=2}^n A(k)b(k) - \sum_{k=3}^n A(k-1)b(k) \\ &= \sum_{k=2}^n A(k)b(k) - \sum_{k=2}^{n-1} A(k)b(k+1) \\ &= A(n)b(n) + \sum_{k=2}^{n-1} A(k)(b(k) - b(k+1)) \\ &= A(n)b(n) - \sum_{k=2}^{n-1} A(k) \int_k^{k+1} b'(t) dt \\ &= A(n)b(n) - \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} A(k)b'(t) dt \end{aligned}$$

Or pour tout  $k \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$  et pour tout  $t \in [k, k+1]$ , on a

$$A(t) = A(k)$$

D'où

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n a_k b(k) &= A(n)b(n) - \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} A(t)b'(t) dt \\ &= A(n)b(n) - \int_2^n A(t)b'(t) dt \end{aligned}$$

17a.

Pour  $n = 1$

$$\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p = 1$$

Pour  $n = 2$

$$\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p = 2$$

Pour  $n = 3$

$$\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p = 6$$

17b. Si  $n$  est pair et  $n > 2$ , alors  $n$  n'est pas premier, par suite

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p &= \prod_{\substack{p \leq n-1 \\ p \text{ premier}}} p \\ &\leq 4^{n-1} \\ &\leq 4^n \end{aligned}$$

17c. Soit  $n = 2m + 1$  avec  $m \in \mathbb{N}$ , on a

$$\begin{aligned} m! \binom{2m+1}{m} &= \prod_{k=m+1}^{2m+1} k \\ &= \prod_{\substack{m+1 \leq k \leq 2m+1 \\ kn' \text{ est pas premier}}} k \times \prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \end{aligned}$$

D'où

$$\prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \text{ divise } m! \binom{2m+1}{m}$$

Or pour tout  $p$  premier tel que  $m+1 \leq p \leq 2m+1$ , on a

$$p \wedge m! = 1$$

Donc

$$\prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \wedge m! = 1$$

Ainsi

$$\prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \text{ divise } \binom{2m+1}{m}$$

D'autre part, on a

$$\begin{aligned} \binom{2m+1}{m} &= \frac{1}{2} \left[ \binom{2m+1}{m} + \binom{2m+1}{m+1} \right] \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} \\ &= \frac{1}{2} \times 2^{2m+1} \\ &= 4^m \end{aligned}$$

17d. On a d'après ce qui précède

$$\prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \text{ divise } \binom{2m+1}{m}$$

Et

$$\binom{2m+1}{m} \leq 4^m$$

Donc

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p &\leq \binom{2m+1}{m} \\ &\leq 4^m \end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p &= \prod_{\substack{p \leq m \\ p \text{ premier}}} p \times \prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \\ &\leq 4^m \times 4^m \\ &\leq 4^{2m+1} \\ &= 4^n \end{aligned}$$

D'où par récurrence forte, pour tout  $n \geq 1$

$$\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p \leq 4^n$$

**18.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $p$  un nombre premier

On a

$$\begin{aligned} \nu_p(n!) &= \sum_{k=1}^n \nu_p(k) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{+\infty} \delta_{j,k} \end{aligned}$$

Avec pour tout  $j, k \in \mathbb{N}$

$$\delta_{j,k} := \begin{cases} 1 & \text{si } p^j \text{ divise } k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Or la somme  $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{+\infty} \delta_{j,k}$  est fini, alors

$$\begin{aligned} \nu_p(n!) &= \sum_{j=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^n \delta_{j,k} \\ &= \sum_{j=1}^{+\infty} \text{Card}\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, kp^j \leq n\} \\ &= \sum_{j=1}^{+\infty} E\left(\frac{n}{p^j}\right) \end{aligned}$$

Par suite

$$\frac{n}{p} - 1 \leq E\left(\frac{n}{p}\right) \leq \nu_p(n!) = \sum_{j=1}^{+\infty} E\left(\frac{n}{p^j}\right) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{n}{p^j} = \frac{n}{p} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$$

D'où le résultat.

**19a.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

On a la fonction  $t \mapsto \ln(t)$  est croissante, et continue sur  $[1, +\infty[$ , donc

$$\sum_{k=1}^{n-1} \ln(k) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \ln(t) dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1)$$

Avec

$$\sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \ln(t) dt = \int_1^n \ln(t) dt = n \ln(n) - n + 1$$

Donc

$$n \ln(n) - n + 1 \leq \sum_{k=1}^n \ln(k) \leq n \ln(n) + \ln(n) - n + 1$$

D'où

$$\sum_{k=1}^n \ln(k) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \ln(n) - n + O(\ln(n))$$

19b. D'après le théorème fondamental de l'arithmétique et par définition de la valuation, on a

$$n! = \prod_{p \text{ premier}} p^{\nu_p(n!)}$$

Avec pour tout  $p > n$  premier  $\nu_p(n!) = 0$  (car  $p \wedge n! = 1$ ).

D'où

$$n! = \prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p^{\nu_p(n!)}$$

Par suite

$$\ln(n!) = \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \nu_p(n!) \ln(p)$$

D'une part, on a

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \nu_p(n!) \ln(p) &\leq \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \left( \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)} \right) \ln(p) \\ &\leq n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} + n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p(p-1)} \end{aligned}$$

D'autre part

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \nu_p(n!) \ln(p) &\geq \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \left( \frac{n}{p} - 1 \right) \ln(p) \\ &\geq n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \ln(p) \\ &= n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - \ln \left( \prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p \right) \\ &\geq n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - n \ln(4) \end{aligned}$$

D'où

$$n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - n \ln(4) \leq \ln(n!) \leq n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} + n \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p(p-1)}$$

19c. On a

$$\frac{\ln(k)}{k(k-1)} \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)$$

D'où par la somme de Reimman, la série  $\sum_{k \geq 2} \frac{\ln(k)}{k(k-1)}$  converge.

19d. D'après ce qui précède, on a

$$\frac{\ln(n!)}{n} - \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p(p-1)} \leq \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} \leq \frac{\ln(n!)}{n} + \ln(4)$$

On a d'après la formule de Stirling

$$\frac{\ln(n!)}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + O(1)$$

Avec  $\sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p(p-1)}$  converge car  $\sum_{k \geq 2} \frac{\ln(k)}{k(k-1)}$  converge.

D'où

$$\sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + O(1)$$

**20a.** Soit  $n \geq 2$ ,

Pour

$$b: t \in [2, +\infty[ \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$$

et

$$A: t \in [2, +\infty[ \mapsto \sum_{\substack{p \leq t \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} = \sum_{2 \leq k \leq t} \frac{\ln(k)}{k} (\omega(k) - \omega(k-1))$$

On a d'après la question 16, pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{2 \leq k \leq n} \frac{\ln(k)}{k} (\omega(k) - \omega(k-1)) \frac{1}{\ln(k)} = \frac{1}{\ln(n)} (R(n) + \ln(n)) + \int_2^n \frac{1}{t(\ln t)^2} (R(t) + \ln(t)) dt$$

Par suite

$$\sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} = 1 + \frac{R(n)}{\ln(n)} + \ln_2(n) - \ln_2(2) + \int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2} dt$$

**20b.** On a la fonction  $t \mapsto \frac{R(t)}{t(\ln(t))^2}$  est continue par morceaux sur  $t \in [2, +\infty[$

De plus, pour tout  $t \in [2, +\infty[$  :

$$\frac{R(t)}{t(\ln(t))^2} = \frac{1}{t(\ln(t))^2} \left( \sum_{\substack{p \leq t \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} \right) - \frac{1}{t \ln(t)}$$

Or, d'après la question 19.d, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p \leq t \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} &= \sum_{\substack{p \leq E(t) \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} \\ &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} \ln(E(t)) + O(1) \\ &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} \ln(t) + O(1) \end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned} \frac{R(t)}{t(\ln(t))^2} &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} \frac{\ln(t) + O(1)}{t(\ln(t))^2} - \frac{1}{t \ln(t)} \\ &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} \frac{O(1)}{t(\ln(t))^2} \\ &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{t(\ln(t))^2}\right) \end{aligned}$$

Puisque pour tout  $t \geq 2$

$$\int_2^t \frac{du}{u(\ln(u))^2} = \frac{1}{\ln(2)} - \frac{1}{\ln(t)}$$

Donc  $t \mapsto \int_2^t \frac{du}{u(\ln(u))^2}$  admet une limite en  $+\infty$ .

En particulier  $t \mapsto \int_2^t \frac{R(u)}{u(\ln(u))^2} du$  est intégrable.

**20c.** On a d'après la question 20.a

$$\sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} = 1 + \frac{R(n)}{\ln(n)} + \ln_2(n) - \ln_2(2) + \int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2} dt$$

Or, d'après la question précédente

$$\frac{R(t)}{t(\ln(t))^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{t(\ln(t))^2}\right)$$

Et

$$\int_2^n \frac{1}{t(\ln(t))^2} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)$$

Alors

$$\int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)$$

Et

$$\begin{aligned} R(n) &= \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - \ln(n) \\ &= \sum_{\substack{p \leq E(n) \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln(p)}{p} - \ln(n) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(E(n)) - \ln(n) + O(1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(1) \end{aligned}$$

D'où

$$\sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(n) + 1 - \ln_2(2) + O\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)$$

D'où le résultat avec  $c_1 = 1 - \ln_2(2)$ .

**21a.** soit  $x \in [1, +\infty[$  et  $q \in \mathbb{N}^*$

On a

$$\begin{aligned} \text{Card}\{n \in \mathbb{N} \cap [1, x]: n \equiv 0 \pmod{q}\} &= \text{Card}\left\{n \in \mathbb{N} \cap [1, x]: \frac{n}{q} \in \mathbb{N}\right\} \\ &= E\left(\frac{x}{q}\right) \end{aligned}$$



D'où

$$\left| \text{Card}\{n \in \mathbb{N} \cap [1, x] : n \equiv 0 \pmod{q}\} - \frac{x}{q} \right| \leq 1$$

D'où le résultat.

**21b.** On a via la question 16

$$\begin{aligned} \frac{1}{E(x)} \sum_{2 \leq n \leq x} \omega(n) &= \sum_{2 \leq n \leq x} \frac{(\omega(n) - \omega(n-1))}{n} - \int_2^{E(x)} \frac{\sum_{2 \leq n \leq t} \omega(n)}{t^2} dt \\ &= \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} - \int_2^{E(x)} \frac{1}{t^2} \sum_{2 \leq n \leq t} \omega(n) dt \\ &\leq \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} - \int_2^{E(x)} \frac{dt}{t} \\ &= \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} - \ln(E(x)) + \ln(2) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(E(x)) + 1 + \ln(2) - \ln_2(2) + O\left(\frac{1}{\ln(E(x))}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(x) + O(1) \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{1}{x} \sum_{2 \leq n \leq x} \omega(n) = \frac{E(x)}{x} \frac{1}{E(x)} \sum_{2 \leq n \leq x} \omega(n) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(x) + O(1)$$

**22a.** On a pour tout  $x \geq 2$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \ln_2(x))^2 &= \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \omega(n)^2 - 2 \frac{\ln_2(x)}{x} \sum_{n \leq x} \omega(n) + \frac{E(x)}{x} (\ln_2(x))^2 \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \omega(n)^2 - 2(\ln_2(x))^2 + O(\ln_2(x)) + (\ln_2(x))^2 \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \omega(n)^2 - (\ln_2(x))^2 + O(\ln_2(x)) \end{aligned}$$

**22b.** Soit  $x \geq 2$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \omega(n)^2 &= \sum_{n \leq x} \left( \sum_{\substack{p|n \\ p \text{ premier}}} 1 \right)^2 \\ &= \sum_{n \leq x} \sum_{\substack{p_1|n \\ p_1 \text{ premier}}} \sum_{\substack{p_2|n \\ p_2 \text{ premier}}} 1 \\ &= \sum_{\substack{p_1 \leq x \\ p_1 \text{ premier}}} \sum_{\substack{p_2 \leq x \\ p_2 \text{ premier}}} \left( \sum_{\substack{n \leq x \\ p_1|n \text{ et } p_2|n}} 1 \right) \\ &= \sum_{\substack{p_1 \leq x \\ p_1 \text{ premier}}} \sum_{\substack{p_2 \leq x \\ p_2 \text{ premier}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^* : n \leq xp_1|n \text{ et } p_2|n\} \end{aligned}$$

**22c.** Pour tout  $x \geq 2$ , on a :

$$\sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*, n \leq x, p_1|n \text{ et } p_2|n\} = \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^* : n \leq x, p_1 p_2 | n\}$$

Or d'après la question 21.a , on a pour tous  $p_1 \neq p_2$  premiers

$$\text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*, n \leq x, p_1 p_2 | n\} - \frac{x}{p_1 p_2} \text{ est bornée}$$

Donc

$$\text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*, n \leq x, p_1 p_2 | n\} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x}{p_1 p_2} + O(1)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*: n \leq x, p_1 | n, p_2 | n\} &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} + O(1) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} + \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} O(1) \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} 1 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sum_{p \leq x} 1 \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} O(\ln_2(x)) \text{ (cf 20.a)} \end{aligned}$$

Donc

$$\sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*: n \leq x, p_1 | n, p_2 | n\} = \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} + O(\ln_2(x))$$

Or, puisque la série  $\sum_{p \geq 2} \frac{1}{p}$  diverge, on a

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 p_2 \text{ premiers}}} \frac{x}{p_1 p_2} - x \sum_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p^2} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left( \sum_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p} \right)^2 - x O(1) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left( \ln_2(E(x)) + c_1 + O\left(\frac{1}{\ln(E(x))}\right) \right)^2 - O(x) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x (\ln_2(x))^2 + O(x \ln_2(x)) \end{aligned}$$

D'où

$$\sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*, n \leq x, p_1 | n \text{ et } p_2 | n\} - x (\ln_2(x))^2 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} O(x \ln_2(x))$$

**22d.** On a d'après ce qui précède, pour tout  $x \geq 2$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \ln_2(x))^2 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \omega(n)^2 - (\ln_2(x))^2 + O(\ln_2(x)) \\
 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} \sum_{\substack{p_1 \leq x \\ p_1 \text{ premier}}} \sum_{\substack{p_2 \leq x \\ p_2 \text{ premier}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*: n \leq x, p_1|n \text{ et } p_2|n\} - (\ln_2(x))^2 + \\
 &\quad O(\ln_2(x)) \\
 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} \sum_{\substack{p_1, p_2 \leq x \\ p_1 \neq p_2 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*: n \leq x, p_1|n \text{ et } p_2|n\} \\
 &\quad + \frac{1}{x} \sum_{\substack{p_1 \leq x \\ p_1 \text{ premiers}}} \text{Card}\{n \in \mathbb{N}^*: n \leq x, p_1|n\} - (\ln_2(x))^2 + O(\ln_2(x)) \\
 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(x)^2 + O(\ln_2(x)) + \frac{1}{x} \sum_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} \frac{x}{p} - (\ln_2(x))^2 + O(\ln_2(x)) \\
 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln_2(n) + c_1 + O\left(\frac{1}{\ln(n)}\right) + O(\ln_2(x)) \\
 &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} O(\ln_2(x))
 \end{aligned}$$

**23.** On pose

$$\varphi = \left\{ n \geq 3: \left| \frac{\omega(n) - \ln_2(n)}{\sqrt{\ln_2(n)}} \right| \geq (\ln_2(n))^{1/4} \right\}$$

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \text{Card}\{n \leq x: n \in \varphi\} = 0$$

On a pour tout  $x$  assez grand,

$$\begin{aligned}
 \text{Card}\{\varphi \cap [1, x]\} &= \text{Card}\{\varphi \cap [\sqrt{x}, x]\} + \text{Card}\{\varphi \cap [1, \sqrt{x}]\} \\
 &= \text{Card}\{\varphi \cap [\sqrt{x}, x]\} + O(\sqrt{x})
 \end{aligned}$$

On a pour tout  $n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]$

$$\frac{(\omega(n) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} \geq (\ln_2(n))^{1/2} \text{ et } x \geq n \geq \sqrt{x}$$

Et

$$\begin{aligned}
 \frac{(\omega(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} &= \frac{(\omega(n) - \ln_2(n) + \ln_2(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} \\
 &= \frac{(\omega(n) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} + \frac{(\ln_2(x) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} + 2 \frac{(\omega(n) - \ln_2(n))(\ln_2(x) - \ln_2(n))}{\ln_2(n)}
 \end{aligned}$$

Par suite on a :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} &= \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} + \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\ln_2(x) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} + \\
 &\quad 2 \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{((\omega(n) - \ln_2(n))(\ln_2(x) - \ln_2(n)))}{\ln_2(n)}
 \end{aligned}$$

Avec

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\ln_2(x) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} & \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x - \sqrt{x}}{\ln_2(x)} o(1) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x}{\ln_2(x)} o(1) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{((\omega(n) - \ln_2(n)))(\ln_2(x) - \ln_2(n))}{\ln_2(n)} & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{o(1)}{\ln_2(\sqrt{x})} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} (\omega(n) - \ln_2(n)) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{o(1)}{\ln_2(x)} \sum_{n \leq x} \omega(n) - \ln_2(n) - \frac{o(1)}{\ln_2(x)} \sum_{n \leq \sqrt{x}} \omega(n) - \ln_2(n) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{o(1)}{\ln_2(x)} (\ln_2(x) - \ln_2(\sqrt{x}) + O(1)) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{o(1)}{\ln_2(x)} \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} & \leq \sum_{n \in [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(n))^2}{\ln_2(n)} \\ & \leq \frac{1}{\ln_2(\sqrt{x})} \left( \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \ln_2(n))^2 - \sum_{n \leq \sqrt{x}} (\omega(n) - \ln_2(n))^2 \right) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} xO(1) - \sqrt{x}O(1) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} xO(1) \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{x}{\ln_2(x)} o(1) + \frac{o(1)}{\ln_2(x)} + xO(1) \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} xO(1) \end{aligned}$$

Or

$$\sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} \geq \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} (\ln_2(n))^{1/2} \geq \text{Card}(\varphi \cap [\sqrt{x}, x]) (\ln_2(\sqrt{x}))^{1/2}$$

Par suite

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{1}{x} \text{Card}(\varphi \cap [\sqrt{x}, x]) & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{1}{x (\ln_2(\sqrt{x}))^{1/2}} \sum_{n \in \varphi \cap [\sqrt{x}, x]} \frac{(\omega(n) - \ln_2(x))^2}{\ln_2(n)} \\ & \underset{x \rightarrow +\infty}{\leq} \frac{O(1)}{(\ln_2(\sqrt{x}))^{1/2}} \end{aligned}$$

$$\text{Avec } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{O(1)}{(\ln_2(\sqrt{x}))^{1/2}} = 0. \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \text{Card}(\varphi \cap [\sqrt{x}, x]) = 0$$

$$\text{Par suite } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \text{Card}(\varphi \cap [0, x]) = 0$$

D'où le résultat.