

Champ magnétique

Julien Cubizolles

Lycée Louis le Grand

Vendredi 7 juin 2018

Champ magnétique

Julien Cubizolles

Lycée Louis le Grand

Vendredi 7 juin 2018

- ▶ on connaît les aimants **droits** (fermeture de porte), « plats » (frigo), les boussoles

- ▶ on connaît les aimants **droits** (fermeture de porte), « plats » (frigo), les boussoles
- ▶ leur champ magnétique est la manifestation macroscopique de champs magnétiques atomiques qui s'ajoutent, pour les matériaux dits **ferromagnétiques**

- ▶ on connaît les aimants **droits** (fermeture de porte), « plats » (frigo), les boussoles
- ▶ leur champ magnétique est la manifestation macroscopique de champs magnétiques atomiques qui s'ajoutent, pour les matériaux dits **ferromagnétiques**
- ▶ aimants **microscopiques** utilisés pour les disques durs par exemple

- ▶ on connaît les aimants **droits** (fermeture de porte), « plats » (frigo), les boussoles
- ▶ leur champ magnétique est la manifestation macroscopique de champs magnétiques atomiques qui s'ajoutent, pour les matériaux dits **ferromagnétiques**
- ▶ aimants **microscopiques** utilisés pour les disques durs par exemple
- ▶ aimants **permanents macroscopiques** pour les fermetures de porte, **électroaimants** pour l'imagerie médicale et les accélérateurs de physique des particules

- ▶ on connaît les aimants **droits** (fermeture de porte), « plats » (frigo), les boussoles
- ▶ leur champ magnétique est la manifestation macroscopique de champs magnétiques atomiques qui s'ajoutent, pour les matériaux dits **ferromagnétiques**
- ▶ aimants **microscopiques** utilisés pour les disques durs par exemple
- ▶ aimants **permanents macroscopiques** pour les fermetures de porte, **électroaimants** pour l'imagerie médicale et les accélérateurs de physique des particules
- ▶ champ magnétique terrestre dû à des courants dans le noyau liquide

- ▶ dans le cours sur la force de Lorentz, on a vu son effet sur un aimant

- ▶ dans le cours sur la force de Lorentz, on a vu son effet sur un aimant
- ▶ on va « observer » le champ \vec{B} avec des aiguilles de boussole et présenter les outils de représentation d'un **champ vectoriel**

- ▶ dans le cours sur la force de Lorentz, on a vu son effet sur un aimant
- ▶ on va « observer » le champ \vec{B} avec des aiguilles de boussole et présenter les outils de représentation d'un **champ vectoriel**
- ▶ on distinguera des propriétés générales, mais sans rien calculer (2^e année)

- ▶ dans le cours sur la force de Lorentz, on a vu son effet sur un aimant
- ▶ on va « observer » le champ \vec{B} avec des aiguilles de boussole et présenter les outils de représentation d'un **champ vectoriel**
- ▶ on distinguera des propriétés générales, mais sans rien calculer (2^e année)
- ▶ on verra le champ des structures fondamentales : fil, spire, bobines de Helmholtz, solénoïde

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

1.1 Sources du champ

1.2 Visualisation

1.3 Intensité du champ magnétique

2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil
 - ▶ B croît quand l'intensité I croît

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil
 - ▶ B croît quand l'intensité I croît
- ▶ la direction de la position d'équilibre de la boussole donne celle de \vec{B} :

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil
 - ▶ B croît quand l'intensité I croît
- ▶ la direction de la position d'équilibre de la boussole donne celle de \vec{B} :
 - ▶ la direction de \vec{B} dépend de la position

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil
 - ▶ B croît quand l'intensité I croît
- ▶ la direction de la position d'équilibre de la boussole donne celle de \vec{B} :
 - ▶ la direction de \vec{B} dépend de la position
 - ▶ \vec{B} « tourne » autour du fil

Expérience d'Ørsted

- ▶ un aimant droit fixe l'orientation d'une boussole
- ▶ un courant dans un fil rectiligne a le même effet : il produit lui aussi un **champ magnétique**
- ▶ son intensité B est d'autant plus grande que la fréquence d'oscillation de la boussole est grande :
 - ▶ B croît quand on est proche du fil
 - ▶ B croît quand l'intensité I croît
- ▶ la direction de la position d'équilibre de la boussole donne celle de \vec{B} :
 - ▶ la direction de \vec{B} dépend de la position
 - ▶ \vec{B} « tourne » autour du fil
 - ▶ le sens est donné par la **règle de la main droite**

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

1.1 Sources du champ

1.2 Visualisation

1.3 Intensité du champ magnétique

2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique

Champ vectoriel

Définition (Champ vectoriel)

Le champ magnétique est un **champ vectoriel** associant à tout **point** M de l'espace un **vecteur** de \mathbb{R}^3 .

il « suffit » de placer une aiguille de boussole en chaque point pour déterminer son sens et sa direction...

Limaille de fer

- ▶ des « copeaux » de fer (limaille) dans un champ \vec{B} s'aimantent

Limaille de fer

- ▶ des « copeaux » de fer (limaille) dans un champ \vec{B} s'aimantent
- ▶ ils s'alignent comme des aiguilles de boussole, et s'agglomèrent pour former des « lignes de champ »

Limaille de fer

- ▶ des « copeaux » de fer (limaille) dans un champ \vec{B} s'aimantent
- ▶ ils s'alignent comme des aiguilles de boussole, et s'agglomèrent pour former des « lignes de champ »
- ▶ ils ne fournissent aucune information sur l'intensité de \vec{B}

Limaille de fer

- ▶ des « copeaux » de fer (limaille) dans un champ \vec{B} s'aimantent
- ▶ ils s'alignent comme des aiguilles de boussole, et s'agglomèrent pour former des « lignes de champ »
- ▶ ils ne fournissent aucune information sur l'intensité de \vec{B}

Définition (Ligne de champ)

Une ligne de champ \vec{B} est une courbe \mathcal{C} de l'espace telle qu'en chacun de ses points M le champ $\vec{B}(M)$ est tangent à \mathcal{C} .

Limaille de fer

- ▶ des « copeaux » de fer (limaille) dans un champ \vec{B} s'aimantent
- ▶ ils s'alignent comme des aiguilles de boussole, et s'agglomèrent pour former des « lignes de champ »
- ▶ ils ne fournissent aucune information sur l'intensité de \vec{B}

Définition (Ligne de champ)

Une ligne de champ \vec{B} est une courbe \mathcal{C} de l'espace telle qu'en chacun de ses points M le champ $\vec{B}(M)$ est tangent à \mathcal{C} .

tracée approximativement de proche en proche, à partir d'un point particulier

Cartes de champ magnétique


Cartes de champ magnétique

- ▶ la **loi de Biot et Savart** permet de calculer le champ B en tout point M connaissant la distribution du courant en tout point P (voir plus loin)


Cartes de champ magnétique

- ▶ la **loi de Biot et Savart** permet de calculer le champ B en tout point M connaissant la distribution du courant en tout point P (voir plus loin)
- ▶ on représente \vec{B} dans un plan par une flèche indiquant direction/sens/intensité aux nœuds d'une grille

Cartes de champ magnétique




Cartes de champ magnétique




- fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille

Cartes de champ magnétique




- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
- ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil

Cartes de champ magnétique




- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
- ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
- ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace

Cartes de champ magnétique




- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
- ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
- ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace
- ▶ $\|\vec{B}\|$ varie en $1/r$ avec r la distance au centre du fil

Cartes de champ magnétique




- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
- ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
- ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace
- ▶ $\|\vec{B}\|$ varie en $1/r$ avec r la distance au centre du fil

Cartes de champ magnétique




- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
 - ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ varie en $1/r$ avec r la distance au centre du fil
- ▶ figure indépendante du plan orthogonal au fil : invariance par translation le long du fil

Cartes de champ magnétique



- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
 - ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ varie en $1/r$ avec r la distance au centre du fil
- ▶ figure indépendante du plan orthogonal au fil : invariance par translation le long du fil
 - ▶ $\vec{B}(M)$ n'a pas de composante orthogonale au plan

Cartes de champ magnétique



- ▶ fil orthogonal au plan et courant « sortant » de la feuille
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ invariante par rotation autour du fil, dans un plan orthogonal au fil
 - ▶ \vec{B} tourne avec l'espace comme un vecteur de l'espace
 - ▶ $\|\vec{B}\|$ varie en $1/r$ avec r la distance au centre du fil
- ▶ figure indépendante du plan orthogonal au fil : invariance par translation le long du fil
 - ▶ $\vec{B}(M)$ n'a pas de composante orthogonale au plan
 - ▶ ici $\|\vec{B}\|$ diverge quand $r \rightarrow 0$: cette anomalie disparaît quand on tient compte du rayon non nul du fil

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

1.1 Sources du champ

1.2 Visualisation

1.3 Intensité du champ magnétique

2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique

Mesure

- ▶ $\|\vec{B}\|$ s'exprime en T

$$[F] = [qvB] \quad \rightarrow \quad 1\text{T} = 1\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$$

Mesure

- ▶ $\|\vec{B}\|$ s'exprime en T

$$[F] = [qvB] \quad \rightarrow \quad 1\text{T} = 1\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$$

- ▶ on mesure $\|\vec{B}\|$ à l'aide d'une sonde à effet Hall

Mesure

- ▶ $\|\vec{B}\|$ s'exprime en T


$$[F] = [qvB] \quad \rightarrow \quad 1\text{T} = 1\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$$

- ▶ on mesure $\|\vec{B}\|$ à l'aide d'une sonde à effet Hall
- ▶ elle indique la composante de \vec{B} dans la direction où elle pointe

Ordres de grandeur

- ▶ un champ de 1 T correspond à une très grande intensité, on utilisera également le gauss $1 \text{ G} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
- ▶ composante horizontale du champ terrestre $B_H \simeq 0,2 \text{ G}$, aimant droit 5 mT, petits aimants très « puissants » : 1 T à la surface.
- ▶ les plus intenses : imagerie médicale, 50 T, $1 \cdot 10^8 \text{ T}$ dans une étoile à neutrons.


Sur une carte de champ



- ▶ le long d'une ligne de champ, l'intensité maximale dans le plan de la spire

Champ d'une spire circulaire.


Sur une carte de champ



Champ d'une spire circulaire.

- ▶ le long d'une ligne de champ, l'intensité maximale dans le plan de la spire
- ▶ la spire « resserre » les lignes de champ : $\|\vec{B}\|$ est maximale là où elles sont le plus serrées

Sur une carte de champ



Champ d'une spire circulaire.

- ▶ le long d'une ligne de champ, l'intensité maximale dans le plan de la spire
- ▶ la spire « resserre » les lignes de champ : $\|\vec{B}\|$ est maximale là où elles sont le plus serrées
- ▶ au voisinage des fils, on retrouve que \vec{B} leur tourne autour (main droite)

1. Caractéristiques générales du champ magnétique
2. Configurations usuelles
3. Moment magnétique

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

2. Configurations usuelles

2.1 Fil rectiligne infini

2.2 Spire

2.3 Solénoïde

3. Moment magnétique

Expression

Expression

- ▶ à r d'un fil parcouru par I : $\|\vec{B}\| \propto I/r$; il manque une constante pour la dimension

Expression

- ▶ à r d'un fil parcouru par I : $\|\vec{B}\| \propto I/r$; il manque une constante pour la dimension
- ▶ la **loi de Biot et Savart** (2^e année) permet de calculer le champ B en tout point M connaissant la distribution du courant en tout point P

Expression

Champ magnétique d'un fil infini


Le champ créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I stationnaire est orthoradial :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$

Expression


- ▶ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$ est la **perméabilité magnétique du vide**
- ▶ ♥ forme générale : $[B] = \frac{\mu_0 \times \text{intensité}}{\text{longueur}}$

Courbe



- ▶ le T est une « grande » unité (il faut aller à $0,2 \mu\text{m}$) pour $\|\vec{B}\| \simeq 1 \text{ T}$

Courbe



- ▶ le T est une « grande » unité (il faut aller à $0,2 \mu\text{m}$) pour $\|\vec{B}\| \simeq 1 \text{ T}$
- ▶ expression valable si on est suffisamment proche de tout fil non rectiligne

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

2. Configurations usuelles

2.1 Fil rectiligne infini

2.2 Spire


2.3 Solénoïde

3. Moment magnétique

Une seule spire

- ▶ on « boucle un fil rectiligne sur lui même »
- ▶ 1 enroulement circulaire de rayon R parcouru par un courant d'intensité I
- ▶ la contribution fils l'alimentant peut être rendue négligeable (en les entortillant)

Une seule spire




Champ d'une spire circulaire d'axe Oz .

- ▶ carte du champ dans le plan Oxz
- ▶ on reconnaît le champ du fil au voisinage de $x = \pm R$
- ▶ invariance par rotation autour de Oz : on aurait la même dans le plan Ozy
- ▶ on n'a plus l'invariance par translation le long de l'axe Oz
- ▶ $\vec{B}(M) \propto \vec{e}_z$ pour $M \in (Oz)$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z,$$


- ▶ nouvelle « règle de la main droite » pour déterminer le sens de \vec{B} sur l'axe

- ▶ maximal au centre de la spire




Composante selon \vec{e}_z du champ
d'une spire d'axe Oz . Rayon
 $R = 10$ cm, intensité $I = 1$ A.

- ▶ maximal au centre de la spire
- ▶ si on a N tours, l'intensité est multipliée par N



Composante selon \vec{e}_z du champ
d'une spire d'axe Oz . Rayon
 $R = 10$ cm, intensité $I = 1$ A.


- ▶ maximal au centre de la spire
- ▶ si on a N tours, l'intensité est multipliée par N
- ▶ pour une spire carré/rectangulaire/... l'ordre de grandeur sera le même



Composante selon \vec{e}_z du champ
d'une spire d'axe Oz . Rayon
 $R = 10$ cm, intensité $I = 1$ A.


Configuration de Helmholtz

- ▶ on adoucit les variations de $\|\vec{B}\|$ sur l'axe en rajoutant une spire identique parallèle et coaxiale à la distance D
- ▶ c'est pour $D = R$ que $\|\vec{B}\|$ est la plus uniforme au centre du dispositif



Composante selon \vec{e}_z du champ d'une paire de bobines d'axe Oz en configuration Helmholtz. Rayon $R = 10$ cm, intensité 1 A, 100 tours.

Configuration de Helmholtz



- ▶ les lignes de champ sont assez parallèles proche du centre
- ▶ rajouter une bobine « canalisée » les lignes de champ magnétique et le rend plus uniforme

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

2. Configurations usuelles

2.1 Fil rectiligne infini

2.2 Spire

2.3 Solénoïde

3. Moment magnétique

Champ d'un solénoïde

Champ d'un solénoïde

- ▶ on accole plusieurs spires identiques pour **canaliser le champ**




Champ d'un solénoïde

- ▶ on accole plusieurs spires identiques pour **canaliser le champ**
- ▶ le champ est de plus en plus **uniforme à l'intérieur**, **faible** à l'extérieur


Champ d'un solénoïde

- ▶ on accole plusieurs spires identiques pour **canaliser le champ**
- ▶ le champ est de plus en plus **uniforme à l'intérieur**, **faible** à l'extérieur
- ▶ l'intensité à l'intérieur est **indépendante du rayon**

Champ d'un solénoïde



Champ d'un solénoïde



Champ d'un solénoïde

Le champ d'un solénoïde infini d'axe Oz , formé d'un enroulement de n spires par unité de longueur accolées est


- ▶ uniforme dans le solénoïde,
- ▶ nul à l'extérieur.

À l'intérieur, on a :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z,$$

avec I l'intensité du courant parcourant chaque spire.

Champ d'un solénoïde



- ▶ le sens du champ \vec{B} est donné par la règle de la main droite de la spire
- ▶ n est en m^{-1} , le nombre **total** de spires n'a aucune influence sur l'intensité du champ
- ▶ expression valable si le solénoïde est assez grand ($l \gg R$), le diamètre des fils négligeable et si on regarde loin des bords
- ▶ avec $I = 1 \text{ A}$, $n = 20 \text{ cm}^{-1}$: $B = 25 \text{ G}$

1. Caractéristiques générales du champ magnétique
2. Configurations usuelles
3. Moment magnétique

1. Caractéristiques générales du champ magnétique


2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique


3.1 Aimant permanent et spire en champ lointain

3.2 Modèle du dipôle magnétique


- ▶ on connaissait avant tout le champ d'un aimant permanent
- ▶ sa structure est-elle radicalement différente de celle d'un électro-aimant ?




Lignes de champ d'un aimant droit vertical




Lignes de champ d'une spire d'axe de révolution vertical, observées à une distance grande devant son rayon




Lignes de champ d'un aimant droit vertical



Lignes de champ d'une spire d'axe de révolution vertical, observées à une distance grande devant son rayon




Lignes de champ d'un aimant droit vertical




Lignes de champ d'une spire d'axe de révolution vertical, observées à une distance grande devant son rayon

- ▶ structure identique à grande distance pour une spire, une paire de Helmholtz, un solénoïde fini, un aimant droit




Lignes de champ d'un aimant droit vertical




Lignes de champ d'une spire d'axe de révolution vertical, observées à une distance grande devant son rayon

- ▶ structure identique à grande distance pour une spire, une paire de Helmholtz, un solénoïde fini, un aimant droit
- ▶ les lignes de champ **sortent du pôle Nord** et **rentrent dans le pôle Sud**



Lignes de champ d'un aimant droit vertical



Lignes de champ d'une spire d'axe de révolution vertical, observées à une distance grande devant son rayon

- ▶ structure identique à grande distance pour une spire, une paire de Helmholtz, un solénoïde fini, un aimant droit
- ▶ les lignes de champ **sortent du pôle Nord** et **rentrent dans le pôle Sud**
- ▶ la spire est la « brique fondamentale » des sources de champ magnétique statique comme la charge ponctuelle pour le champ électrique statique

1. Caractéristiques générales du champ magnétique

2. Configurations usuelles

3. Moment magnétique

3.1 Aimant permanent et spire en champ lointain

3.2 Modèle du dipôle magnétique

Définition

Définition (Dipôle et moment magnétiques)

Un **dipôle magnétique** est une spire circulaire plane de rayon R parcourue par un courant d'intensité I . Il est caractérisé par son **moment dipolaire magnétique**, noté \vec{m} , défini par :

$$\vec{m} = IA\vec{e}_z = I\pi R^2\vec{e}_z,$$


avec :

- ▶ $A = \pi R^2$ la surface de la spire
- ▶ $\|\vec{m}\|$ en $A \cdot m^2$
- ▶ \vec{e}_z le vecteur normal au plan de la spire, orienté par la **règle de la main droite**

Approximation dipolaire

Approximation dipolaire

Quand on l'observe à une distance grande devant ses dimensions caractéristiques, toute boucle de courant plane est équivalente au dipôle magnétique correspondant.




Approximation dipolaire

Approximation dipolaire

Quand on l'observe à une distance grande devant ses dimensions caractéristiques, toute boucle de courant plane est équivalente au dipôle magnétique correspondant.


- ▶ pour une spire rectangulaire : $\vec{m} = Iab\vec{e}_z$



Approximation dipolaire

Approximation dipolaire

Quand on l'observe à une distance grande devant ses dimensions caractéristiques, toute boucle de courant plane est équivalente au dipôle magnétique correspondant.



- ▶ pour une spire rectangulaire : $\vec{m} = Iab\vec{e}_z$
- ▶ \vec{m} suffit pour calculer le champ \vec{B} créé par le dipôle, la force qu'il subit quand il est placé dans le champ magnétique créé par d'autres sources

Aimants permanents

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique
- ▶ le moment magnétique macroscopique dans un matériau ferromagnétique est la somme de ces moments magnétiques atomiques, qui s'alignent quand on l'aimante et restent alignés par leur interaction mutuelle

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique
- ▶ le moment magnétique macroscopique dans un matériau ferromagnétique est la somme de ces moments magnétiques atomiques, qui s'alignent quand on l'aimante et restent alignés par leur interaction mutuelle
- ▶ le vecteur moment magnétique est aligné avec l'aimant droit, dirigé du sud vers le nord magnétique

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique
- ▶ le moment magnétique macroscopique dans un matériau ferromagnétique est la somme de ces moments magnétiques atomiques, qui s'alignent quand on l'aimante et restent alignés par leur interaction mutuelle
- ▶ le vecteur moment magnétique est aligné avec l'aimant droit, dirigé du sud vers le nord magnétique
- ▶ on caractérise un matériau par son **aimantation** notée \mathcal{M} , moment magnétique par unité de volume

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique
- ▶ le moment magnétique macroscopique dans un matériau ferromagnétique est la somme de ces moments magnétiques atomiques, qui s'alignent quand on l'aimante et restent alignés par leur interaction mutuelle
- ▶ le vecteur moment magnétique est aligné avec l'aimant droit, dirigé du sud vers le nord magnétique
- ▶ on caractérise un matériau par son **aimantation** notée \mathcal{M} , moment magnétique par unité de volume
- ▶ \mathcal{M} est dans le sens sud-nord pour un aimant droit

Aimants permanents

- ▶ un électron en mouvement de révolution autour de son noyau (en mécanique classique) constitue un dipôle magnétique, le résultat demeure en mécanique quantique
- ▶ le moment magnétique macroscopique dans un matériau ferromagnétique est la somme de ces moments magnétiques atomiques, qui s'alignent quand on l'aimante et restent alignés par leur interaction mutuelle
- ▶ le vecteur moment magnétique est aligné avec l'aimant droit, dirigé du sud vers le nord magnétique
- ▶ on caractérise un matériau par son **aimantation** notée \mathcal{M} , moment magnétique par unité de volume
- ▶ \mathcal{M} est dans le sens sud-nord pour un aimant droit
- ▶ un aimant brisé donne deux aimants...

Aimants permanents

Ordres de grandeur

dimensionnellement : le champ magnétique caractéristique (à la surface) est $B \simeq \mu_0 \mathcal{M}$

	\mathcal{M}	B
acier	$\simeq 1 \cdot 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 1 \cdot 10^{-2} \text{ T}$
ferrite (céramique d'oxyde de fer)	$\simeq 2 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 2 \cdot 10^{-1} \text{ T}$
Alnico (alliages AlNiCo)	$\simeq 1 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 0,1 \text{ T}$
aimants au néodyme (alliage NdFeB)	$\simeq 1 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 1 \text{ T}$


Aimants permanents

Ordres de grandeur

dimensionnellement : le champ magnétique caractéristique (à la surface) est $B \simeq \mu_0 \mathcal{M}$


	\mathcal{M}	B
acier	$\simeq 1 \cdot 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 1 \cdot 10^{-2} \text{ T}$
ferrite (céramique d'oxyde de fer)	$\simeq 2 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 2 \cdot 10^{-1} \text{ T}$
Alnico (alliages AlNiCo)	$\simeq 1 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 0,1 \text{ T}$
aimants au néodyme (alliage NdFeB)	$\simeq 1 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\simeq 1 \text{ T}$

on peut courber un aimant droit pour obtenir une zone de champ quasi-uniforme dans un aimant en U




Champ magnétique terrestre

- ▶ le champ magnétique terrestre est dû aux courants dans la partie liquide du noyau




Champ magnétique terrestre

- ▶ le champ magnétique terrestre est dû aux courants dans la partie liquide du noyau
- ▶ structure proche d'un dipôle magnétique : ☠ le pôle nord **magnétique** est le pôle sud **géographique**



Champ magnétique terrestre

- ▶ le champ magnétique terrestre est dû aux courants dans la partie liquide du noyau
- ▶ structure proche d'un dipôle magnétique : ☠ le pôle nord **magnétique** est le pôle sud **géographique**
- ▶ ordre de grandeur à la surface terrestre $B = 0,48 \text{ G}$ et une composante horizontale $B_H = 0,2 \text{ G}$



Indispensable

- ▶ \vec{B} tourne autour des courants, son sens est donné par la règle de la main droite
- ▶ $\|\vec{B}\|$ croît quand on s'approche des fils, elle y diverge s'ils sont de rayon nul
- ▶ $\|\vec{B}\|$ augmente le long d'une ligne de champ quand les lignes de champ se resserrent
- ▶ $[B] = \frac{\mu_0 \times \text{intensité}}{\text{longueur}}$
- ▶ $\vec{m} = IS\vec{e}_z$ pour un dipôle magnétique